

## Aktuality č. 8

Vážení pestovatelia,

O čom sa dočítate v tomto vydaní:

- ✓ Predzberová aplikácia do repky a termíny aplikácie ELASTIQ ULTRA, ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF alebo aplikácia glyfosátu CLINIC TF pre uľahčenie zberu repky

Repka je plodina, do ktorej sa počas celej sezóny investujú vysoké náklady, za čo sa vie odvdáčiť primeranou úrodou. Zber úrody však aj tento rok môže byť komplikovaný, či už z dôvodu nerovnomerného dozrievania alebo dlhotrvajúceho sucha, ktoré nesie so sebou riziká následného prepčania a búrok spojených s ľadovcom. Aby sme predišli takýmto rizikám, odporúčame šesule repky „zalepiť“ a tak si zaistiť úrodu. Mali by sme pripraviť porasty repky na kvalitný zber s čo najmenšími zberovými stratami.

Na predzberové aplikácie do repky Vám spoločnosť AM-AGRO odporúča rôzne technológie podľa stavu porastu:

- ✓ ELASTIQ ULTRA
- ✓ ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF
- ✓ CLINIC TF



### ELASTIQ ULTRA alebo ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF

Pokiaľ sú repky vyrovnané, rovnomerne dozrievajú a chceme ich nechať pozvoľne dozrieť, odporúčame si zaistiť úrodu a obmedziť zberové straty tým, že dozrievajúce šesule „zalepíme“ prípravkom ELASTIQ ULTRA s aktívnou zložkou: karboxylovaný styrén butadién kopolymér 455,5 g/l.

**ELASTIQ ULTRA** je určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát (obmedzuje praskanie šesúl a vypadávanie semien). Po aplikácii tvorí na povrchu šesúl tenkú polymérnu vrstvu, ktorá na vzduchu rýchlo zasychá a vytvára trvale elastickú polopriepustnú membránu. Tá umožňuje výpar a zamedzuje spätnému prenikaniu vody do pletív. ELASTIQ ULTRA sa vyznačuje rýchlym účinkom, najdlhším časom zalepenia šesúl, dokonalou ochranou rastliny pred dažďom a silným obmedzením rozvoja černí.

#### Odporúčanie pre aplikáciu ELASTIQ ULTRA:

Optimálna aplikácia by sa mala vykonať približne 3 - 4 týždne pred plánovaným zberom, (BBCH 80 - 88) v dávke 0,75 - 1,0 l/ha. Šesule by mali byť v dobe aplikácie svetlozelenej farby, pružné, s možnosťou ohnutia do tvaru písmena „U“ alebo „V“ bez následného prasknutia.

#### Odporúčanie pre aplikáciu ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF:

V prípade zaburinených porastoch repky odporúčame ELASTIQ ULTRA kombinovať s prípravkami na báze glyfosátov, napr. CLINIC TF (glyfosate 360 g/l) v dávke ELASTIQ ULTRA 0,75 l/ha + CLINIC TF 3,0 l/ha. Aplikáciu odporúčame vykonať 2 - 3 týždne pred plánovaným zberom, podľa stavu porastu. Šesule by mali byť ešte stále pružné. Pred presnou aplikáciou môžete kontrolovať aj vyfarbenosť semien v šesuliach v spodnejších poschodiach repky.

Využite cenovo zvýhodnené balíčky so 4% zľavou oproti sólo nákupu:

| ZVÝHODNENÉ BALÍKY         | OBSAH        | DÁVKA/HA       | VÝMERA |
|---------------------------|--------------|----------------|--------|
| ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF | 15 l + 60 l  | 0,75 l + 3,0 l | 20 ha  |
| ELASTIQ ULTRA + CLINIC TF | 40 l + 160 l | 0,75 l + 3,0 l | 53 ha  |



Odporúčanie pre ostatné plodiny: ElastiQ Ultra je možné použiť do hrachu na obmedzenie strát pri zbere, ale aj do obilnín v dávke 1 l/ha, kde počas nepriaznivých podmienok zabraňuje prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania porastu pred zberom. Tým znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami, udržiava kvalitatívne parametre zrna, vrátane pádového čísla a klíčivosti zberaného zrna.

### Aplikácia glyfosátu CLINIC TF pre uľahčenie zberu

Ďalšou možnosťou uľahčenia zberu repky je použitie samotného glyfosátu **CLINIC TF** (glyphosate 360 g/l), ktorý znižuje vlhkosť repky. Táto technológia sa uprednostňuje napr. pri veľmi zaburinených pozemkoch pýrom a inými trváciami burinami, aby bol vôbec umožnený mechanizovaný zber. Aplikáciou prípravku CLINIC TF si uľahčíme zber vysušením burín ako sú napr. pichliač, lipkavec, rumany, pýr a iné, v čase, keď majú maximálnu listovú plochu. CLINIC TF v pôde nezanecháva žiadne rezíduá, pretože nie je prijímaný koreňmi ani semenami, ale zelenými časťami a svojim asimilačným prúdením je rozvedený do celej nežiadúcej buriny. Termín aplikácie volíme podľa aktuálneho stavu porastu, približne 10 - 14 dní pred zberom. Presnosť aplikácie môžeme hodnotiť podľa vyfarbenosti šesúľ v strednej časti rastliny, v ktorej by mali byť semená v šesúľach hnedej farby. Odporúčaná dávka prípravku je 3 - 4 l/ha.

CLINIC TF je určený na uľahčenie zberu, likvidáciu a ničenie jednoročných a trvácich burín, drevín a inej nežiadúcej vegetácie v zberaných porastoch a na strniskách. Prípravok likviduje všetky vzídené buriny a zároveň znižuje možnosť ďalšieho zaburinenia pozemku.

**Spoločnosť AM - AGRO** ponúka rôzne technológie predzberových ošetrení do repky. Podľa stavu porastov ostáva rozhodnutie o výbere technológie na pestovateľovi. Pri každej je dôležité správne načasovanie aplikácie, s ktorou vám ochotne pomôže poradenský servis spoločnosti AM - AGRO. Ďakujeme za pozornosť venovanú **Aktualitám č. 8**.

Tím spoločnosti AM-AGRO

*... s nami to ide ľahšie*