

## Aktuality č. 10

Vážený pestovateľ,

O čom sa dočítate v tomto vydaní:

- ☑ Fungicídne ošetrovanie slnečnice – AM EXTRA PLUS
- ☑ Biostimulácia porastov prípravkom ASAHI SL

Zmena počasia v posledných dňoch priniesla so sebou dlho očakávané zrážky na celom území Slovenska, čo výrazne pomohlo rastlinám, najmä jarinám ako sú kukurica, slnečnica či sója. Sucho sa prejavilo už na začiatku vegetácie. Porasty vzhádzali nerovnomerne, vlnovite. Najmä porasty Južného Slovenska trpeli nedostatkom vlhky, veď za mesiace marec, apríl, máj zaznamenali len minimálne zrážky.

Posledné dni sa táto nepriaznivá situácia zmenila a preto sa pestovatelia slnečnice a sóje musia pripraviť na preventívnu ochranu proti hubovým patogénom.

### Fungicídne ošetrovanie slnečnice – AM EXTRA PLUS

Po zapojení porastov slnečnice odporúčame vykonať fungicídne ošetrovanie proti bielej hnilobe prípravkom AM EXTRA PLUS (azoxystrobin 200 g/l, cyproconazole 80 g/l). Je vhodné spojiť s aplikáciou biostimulátora ASAHI SL a listovej výživy bórom MIKROVIT BÓR. Biela hniloba je najrozšírenejšia a najnebezpečnejšia choroba slnečnice. Pri skoršej infekcii choroba napáda stonku a rastlina začína vädnúť. Neskôr huba napáda úbor slnečnice, ktorý zvnútra začne hniť. To má za následok vypadávanie nažiek z úboru, čo spôsobuje významné straty na úrodách. Symptómy ochorenia sa objavujú až po odkvitnutí slnečnice. Patogén infikuje kvietky a až po niekoľkých dňoch je už možné na napadnutých úboroch pozorovať prvé symptómy hniloby v podobe hnedých škvŕn na spodnej strane úborov. Práve pre to je veľmi dôležité vykonať fungicídnu ochranu slnečnice preventívne.



**AM EXTRA PLUS** (azoxystrobin 200 g/l, cyproconazole 80 g/l)

- ☑ širokospektrálny fungicíd so systémovým účinkom
- ☑ chráni aj novonarastené prírastky
- ☑ dlhý preventívny a kuratívny účinok
- ☑ silný „green efekt“ chráni rastlinu a podporuje fotosyntetickú aktivitu, čo má pozitívny vplyv na tvorbu úrody, resp. nažiek
- ☑ účinkuje proti bielej hnilobe, plesni sivej, diaportovej škvŕnitosti slnečnice, plesni slnečnicovej a hrdze slnečnicovej
- ☑ aplikácia počas vegetácie je možná 2 – krát
- ☑ 1. aplikácia: BBCH 18 – 31, od rastového štádia 8 a viac listov
- ☑ 2. aplikácia: BBCH 53-55, od rastového štádia vývoja súkvetia, resp. od oddeľovania úboru od najmenších listov
- ☑ dávkovanie: 0,75 l/ha



**Biostimulácia porastov prípravkom ASAHI SL**

**ASAHI SL** (zmes nitrofenolátov)

- ✎ biostimulátor rastu a vývoja s výrazným protistresovým účinkom
- ✎ zvyšuje obranyschopnosť rastliny a podporuje rýchlejšiu regeneráciu po poškodení chorobami, škodcami, či abiotickými faktormi
- ✎ zefektívňuje aplikáciu a príjem fungicídu rastlinou - odporúčame použiť v tank-mixe




**Samppj**

Je komplexné listové hnojivo obsahujúce makro a mikroprvky vo forme chelátov a látky ako sú cukry, organické kyseliny a podporné zlúčeniny EDTA -chelatizačné činidlo

**Aplikácia ASAHI SL + SAMPPJ má priaznivý vplyv na zvýšený výnos a na olejnatosť nažiek**

**Samppj + ASAHI SL = silný synergický účinok**



Vážený zákazník,  
ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali Aktualitám č. 10.  
V prípade otázok prosím kontaktujte náš poradenský servis.

Tím spoločnosti AM-AGRO

... s nami to ide ľahšie