

AKO ZABEZPEČIŤ ZDRAVÝ LIST A PREDĹŽIŤ JEHO ŽIVOTNOSŤ

Pri pestovaní cukrovej repy dosiahneme zdravý list v prvom rade zabránením šírenia listových chorôb a škodcov. Choroby listov a koreňov resp. buliev cukrovej repy spôsobujú značné ekonomické straty. Medzi najvýznamnejšie choroby patrí **CERKOSPÓRA REPOVÁ**, ktorej prvé príznaky sa objavujú v júni až v júli počas teplého a vlhkého počasia. Toto ochorenie spôsobuje hubový patogén **CERCOSPORA BETICOLA**, ktorý infikuje listy. Typickým znakom sú nekrotické škvrny so svetlejším stredom a tmavým okrajom. Postupným rozšírením sa škvrny zlievajú a v konečnom štádiu list úplne odumiera. Ak je listová plocha zničená, vytvárajú sa nové listy, čím sa znižuje obsah cukru a výnos buliev. Preto je veľmi dôležité 1. fungicídnu ochranu aplikovať preventívne, poprípade hneď pri prvých príznakoch tejto choroby.

Ďalším dôležitým faktorom je zabezpečiť optimálne hospodárenie rastlín s vodou použitím prípravku **ASAHI SL /ATONIK** v dávke **0,6 l/ha**. Ošetrované rastliny sú schopné lepšie čerpať a využívať živiny, tvoria kvalitnejšie pletivá, sú odolnejšie voči suchu, vysokým teplotám a ďalším stresovým faktorom. Rastliny vytvárajú mohutnejší koreňový systém, a aj preto sú odolnejšie voči suchu. **ASAHI SL /ATONIK** navyše zvyšuje obsah obranných látok, ktoré chránia rastlinné bunky pred nepriaznivým účinkom sucha a tepla.

T1	T2	T3
Simplia 0,5 l/ha azoxystrobín 250 g/l	Betafit 1 l/ha difenoconazole 100 g/l fenpropidin 375 g/l	Bagani 0,8 l/ha tetraconazole 125 g/l
Bagani 0,5 l/ha tetraconazole 125 g/l	Cupromix DUO 1,5 l/ha medňaté hnojivo 400 g/l	
Cupromix DUO 1,5 l/ha medňaté hnojivo 400 g/l		

T1	T2	T3
Simplia Gold 1 l/ha azoxystrobín 125 g/l difenoconazole 125 g/l	Bagani 0,8 l/ha tetraconazole 125 g/l	Reef 3 l/ha meď 80g/l síra 640g/l
Cupromix DUO 1,5 l/ha mednaté hnojivo 400 g/l	Cupromix DUO 1,5 l/ha mednaté hnojivo 400 g/l	