

HERBICÍDNA OCHRANA REPKY

Pri herbicídnom ošetrovaní repky sú najúčinnnejšie a najviac používané preemergentné herbicídy, ktoré pre dobrý účinok potrebujú kvalitne pripravenú pôdu bez hrúd a dostatok vlhky. Pri predpoklade optimálneho priebehu počasia a dostatku zrážok je to najefektívnejšie ošetrovanie, ktorým zničíme aj ťažko ničiteľné buriny už v skorých rastových fázach, čo má pozitívny vplyv na následný vývoj repky.

Odporúčame nasledovné varianty herbicídneho ošetrovania:

1. METONARY (metazachlor 500 g/l) + CLOMATE (clomazone 360 g/l)

Kombinácia prípravkov rieši široké spektrum dvojklíčnolistových burín, jednoročných tráv a výmrvu obilnín v repke, vrátane lipkavca, rumanov, kapsičky pastierskej, mrlíkov, hviezdice a maku vlčieho. Výhodou je dlhý pôdny účinok. Aplikáciu odporúčame vykonať preemergentne do troch dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Pri suchej alebo hrudovitej pôde odporúčame pridať PREFIN pre zlepšenie účinku pôdnych herbicídov.

Dávkovanie: METONARY/BRAZIL 1,2 l/ha + CLOMATE 0,2 l/ha.

2. MEZAQUIN (metazachlor 333 g/l) + quinmerac 83 g/l

Prípravok je určený na ničenie dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca, a jednoročných tráv. Aplikácia je možná preemergentne aj skoro postemergentne na práve vzchádzajúce buriny, najneskôr do fázy pravých listov burín. Vyznačuje sa dlhou pôdnou účinnosťou a pomáha udržať porasty repky bez zaburinenia.

MEZAQUIN

ÚČINNÉ LÁTKY: Metazachlor 333 g/l
Quinmerac 83 g/l

CHARAKTERISTIKA

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v horčici, repke ozimnej a jarnej.

KOMPLEXNÉ PREEMERGENTNÉ A POST RIEŠENIE V REPKE A HORČICI

VLASTNOSTI A VÝHODY POUŽITIA

Účinné látky sú prijímané cez korene aj listy burín. Preemergentné aj postemergentné použitie, dlhé reziduálne pôsobenie.

Dávkovanie: 2 l/ha

METONARY

ÚČINNÉ LÁTKY: Metazachlor 500 g/l

CHARAKTERISTIKA

Herbicídny postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej a jarnej.

KLASIKA V OŠETRENÍ REPKY

VLASTNOSTI A VÝHODY POUŽITIA

Aplikácia možná PRE a POST emergentne TM s prípravkom CLOMATE ničí celé spektrum burín. Dlhý pôdny účinok.

Dávkovanie: 1,5 - 2 l/ha, v kombinácii s CLOMATE 1,2 l/ha.

JESENNÁ PONUKA AM-AGRO DO REPKY OZIMNEJ 2026

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/ha	VÝMERA	INDIKATÍVNA CENA
AM REPKA COMPLETE 7% zľava	MEZAQUIN STARPRO 430 SC MIKROVIT BOR	100 l 30 l 100 l	2 l 0,6 l 2 l	50 ha	6 891,80 €
AM REPKA I. 10% zľava	METONARY/BRAZIL CLOMATE	60 l 10 l	1,2 l 0,2 l	50 ha	3 468,96 €
AM REPKA I. Plus 10% zľava	METONARY/BRAZIL CLOMATE CYTHRIN MAX PREFIN	60 l 10 l 2,5 l 5 l	1,2 l 0,2 l 0,05 l 0,1 l	50 ha	4 154,45 €
AM REPKA II. 15% zľava	STARPRO 430 SC ALIGRAM MIKROVIT BOR	30 l 25 l 100 l	0,6 l 0,5 l 2 l	50 ha	2 910,80 €
AM REPKA III. 4,5% zľava	ASPIRE AMCEL	45 l 120 l	0,75 l 2 l	60 ha	2 902,59 €
AM REPKA IV. 18% zľava	STARPRO 430 AMCEL MIKROVIT BOR	30 l 100 l 100 l	0,6 l 2 l 2 l	50 ha	2 285,80 €
AM REPKA V. 19% zľava	STARPRO 430 BEETLON MIKROVIT BOR	30 l 10 l 100 l	0,6 l 0,2 l 2 l	50 ha	2 127,30 €

**INSEKTICÍDY S OKAMŽITÝM ÚČINKOM
PROTI VŠETKÝM JESENNÝM ŠKODCOM
V REPKE A OBILNINÁCH**

CYTHRIN MAX®

(cypermethrin 500 g/l)

BEETLON®

(lambda-cyhalothrin 50 g/l)